

Síntomas de reacción a una transfusión de un producto sanguíneo

Si su niño recibe sangre o productos sanguíneos, esté atento a los siguientes síntomas de una posible reacción a la transfusión.

Durante las primeras 24 horas:

- Fiebre y escalofríos
- Erupción cutánea
- Problemas respiratorios
- Náuseas y/o vómitos
- Sensación de mareo o desmayo

Durante un período de hasta 2 semanas luego de la transfusión:

- Orina roja o marrón
- Cansancio y debilidad
- Coloración amarillenta de los ojos
- Poco o nada de orina
- Fiebre nueva y escalofríos
- Facilidad de moretones o sangrado

Si su niño presenta cualquiera de estos síntomas u otros síntomas de importancia luego de recibir una transfusión, consulte con el doctor o con su enfermera. Si se encuentra dentro del hospital, marque 3300. Localmente, llame al 901-595-3300. Si se encuentra fuera del área de Memphis, marque el número gratuito 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833) y presione 0 una vez comunicado. Se está llamando fuera del horario de atención, solicite hablar con el doctor de guardia.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.