

Delirio

¿Qué es el delirio?

El delirio es un cambio en la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan causado por una afección o tratamiento médico. Si sabemos que su hijo tiene delirio, podemos tratarlo. El tratamiento puede incluir la solución de las causas del delirio, la administración de medicamentos y la modificación del entorno de su hijo.

El delirio que no se trata puede causarles más angustia y confusión a usted y a su hijo. Puede aumentar el riesgo de su hijo de sufrir lesiones o muerte. Su hijo podría además tener problemas para obtener tratamiento o tener que quedarse más tiempo en el hospital.

¿Cuáles son los signos del delirio?

Usted podría pensar que su hijo nunca se ha comportado así antes. Por ejemplo, él podría.

- Actuar confundido, sin saber dónde está o quién es usted.
- Decir cosas que no tienen sentido.
- Ver o escuchar cosas que no están allí.
- Actuar molesto o enojado; su forma habitual de calmarlo no funciona.
- Dormir demasiado o muy poco; o bien duerme mucho durante el día y permanece despierto en la noche.
- Actuar diferente a lo habitual: más temeroso, nervioso, inquieto, vigilante, desconfiado, enojado o desinteresado.
- Rechazar los medicamentos, quitarse la vía intravenosa o no escuchar instrucciones.

¿Qué puede causar delirio?

- Una infección o fiebre.
- Medicamentos, como algunos fármacos de quimioterapia y esteroides.
- Admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos (*Intensive Care Unit*, ICU).
- Problemas de respiración, incluyendo la colocación de un tubo de respiración.
- Problemas con el equilibrio químico del cuerpo; es posible que escuche al médico o al enfermero llamarlo “electrolitos” o “balance electrolítico”.

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.

Delirio

-) Problemas para dormir.
-) Un nuevo entorno.

Cómo el equipo de St. Jude detecta y trata el delirio

El equipo de St. Jude de su hijo controlará atentamente el comportamiento de su hijo. Esto incluye controlar si su hijo está confundido, nervioso o tiene otros posibles signos de delirio.

El delirio puede venir e irse rápidamente. O puede durar varios días o semanas. El tratamiento del delirio generalmente implica encontrar las principales causas y tratarlas. El equipo de St. Jude puede hacer cosas para ayudar a su hijo, incluyendo la administración de medicamentos y la modificación del entorno, si fuera necesario. El médico de su hijo le solicitará al equipo de atención de salud mental que ayude a tratar el delirio de su hijo.

¿Por qué mi hijo necesita servicios de salud mental?

Los proveedores de atención de salud mental están capacitados para descubrir las causas del delirio y ayudar a detenerlo o evitar que empeore. Por ejemplo, un psiquiatra puede recetar medicamentos para tratar el delirio. También puede revisar los medicamentos habituales de su hijo para saber si alguno de ellos podría causar delirio.

El delirio no significa que su hijo tenga una enfermedad mental. Significa que su enfermedad física está afectando su pensamiento, su comportamiento y sus emociones. El equipo de psiquiatría de St. Jude puede atender a su hijo mientras dure el delirio. Tal vez brinden ayuda durante más tiempo si su familia tuviera otras necesidades.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

Estas son algunas cosas que puede probar. Puede recordarlo con las palabras “CARES FOR”.

¿Sabe usted... continuación

Delirio

Comunicación	Use palabras o frases claras, lentas y simples. Repita las cosas y dígame a su hijo quién es usted. Es posible que deba hacer esto con frecuencia mientras el niño tenga delirio.
Actividad	Evite tener restringido a su hijo, como por ejemplo usando un “cinturón de seguridad” para mantenerlo en la cama. Anime a su hijo a hacer cosas por sí mismo.
Reorientación	Reoriente a su hijo respecto a dónde está, quién es usted y qué día y hora es. “Reorientar” significa recordarle, incluso si piensa que su hijo debería saber las cosas.
Entorno	Asegúrese de que la habitación de su hijo se encuentre iluminada durante el día y oscura durante la noche. Intente mantener en silencio la habitación cuando su hijo se encuentre calmado o descansando. Evite tener prendida la televisión cuando su hijo no la esté mirando.

Sueño	Ayude a su hijo a mantenerse despierto la mayor parte del día, si fuere posible. Es posible que su hijo no siempre se mantenga despierto durante el día debido a los medicamentos o los procedimientos. Pero dormir menos durante el día ayuda a que su hijo duerma más durante la noche.
Familiaridad	Entregue a su hijo cosas que le resulten familiares, como su juguete preferido. Ponga música que conozca. Traiga objetos de su hogar a la habitación de su hijo. Evite recibir visitas de personas a quienes su hijo no conozca bien. Solicítele a su equipo de St. Jude que atiendan a su hijo los miembros del personal que le resulten familiares.
Obligar a salir de la cama	Ayude a su hijo a sentarse en la cama, bajarse y caminar lo más que pueda.
Reconfortar	Reconforte y consuele a su hijo. Dígame que estará bien y que usted u otro ser querido permanecerán a su lado.

¿Tiene preguntas?

Si tiene preguntas sobre el delirio, comuníquese con el departamento de Psiquiatría de St. Jude. Si su hijo está en el hospital, usted puede llamar al 901-595-0388 o al 901-595-0389 para comunicarse con un médico. Si su hijo está en casa o en un alojamiento de St. Jude y usted piensa que podría tener delirio, puede traerlo a la Sala de Medicina.

El objetivo de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal o de otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover la participación activa en su atención y tratamiento, proporcionándole información y educación. Las preguntas sobre inquietudes de salud individuales o sobre opciones específicas de tratamiento se deben analizar con su médico.

Delirio

St. Jude Children's Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك الاستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك . يرجى الاتصال بالرقم 5833-1-866-278 (الهاتف النصي: 1-901-595-1040).