

¿A quién llamar? ¿Cuándo llamar? IDS

Si su hijo tiene una emergencia médica que requiera ayuda inmediata, lláme al 911.

Esta guía es para los pacientes de la Clínica de Enfermedades Infecciosas (IDS, por sus siglas en inglés) de el edificio Kmart St. Jude Life Center.

¿A quién llamar?

Utilice la siguiente información para localizar rápidamente a un miembro del equipo médico de su niño.

La clínica principal de su niño es: _____

El doctor de su niño es: _____

La enfermera/o de cabecera de su niño es: _____

Las enfermeras de su niño son: _____

La enfermera que programa las citas de su niño es: _____

El número de teléfono de la clínica de su niño es: _____

Los días y horarios de atención normal de la clínica son: _____

El número principal del hospital es 901-595-3300. Si se encuentra fuera del área de Memphis, marque el número gratuito 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833).

Puede llamar al número de teléfono de la clínica de su niño durante el horario de atención normal.

Llame al número principal del hospital cuando no pueda comunicarse con la clínica principal de su niño. Puede solicitar ayuda al doctor de guardia o preguntar por el Coordinador de Enfermería Clínica.

Siempre hay un miembro del personal disponible para ayudarlo si tiene un problema, una pregunta o una emergencia.

Se le pueden formular preguntas sobre estos datos importantes:

- El diagnóstico de su niño
- El número de ID del hospital de su niño
- El problema actual y su duración

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

¿A quién llamar? ¿Cuándo llamar? IDS

¿Cuándo llamar?

Llame al doctor de su niño o al doctor o a la enfermera de St. Jude Children's Research Hospital si su niño presenta alguno de los síntomas siguientes:

- Fiebre en pacientes mayores de 3 meses:
 - Temperatura oral (tomada por la boca) de 100.9 grados F (38.3 grados C) o superior;
 - Temperatura oral de 100.4 grados F (38.0 grados C) o superior que se mantiene por una hora
 - Temperatura tomada debajo del brazo (axilar) de 99.9 grados F (37.7 grados C); o
 - Temperatura tomada debajo del brazo (axilar) de 99.4 grados F (37.4 grados C) o superior que se mantiene por una hora.
- Fiebre en pacientes menores de 3 meses tomada debajo del brazo (axilar) de 99.4 grados F (37.4 grados C) o superior.
- Exposición a varicela, herpes zoster, rubéola (sarampión alemán), o hepatitis
- Erupción cutánea o picazón
- Aparición de nódulos o bultos hinchados y sensibles en el cuello o debajo de los brazos
- Hormigueo o Adormecimiento en los pies o las manos
- Llagas bucales
- Disnea o dificultad para respirar
- Dolor de oído, dolor de garganta, síntomas de gripe
- Náuseas, vómitos o dolor de estómago
- Diarrea por más de 48 horas
- Un cambio importante en la enfermedad

Usted deberá comunicarse con el médico de su niño de St. Jude si lleva a su niño al hospital local o a un médico para que lo atiendan de urgencia o por algo que no estaba planeado.

Si llama fuera de las horas de atención, marque 901-595-3300 y pida con el médico de guardia. Si se encuentra fuera del área de Memphis, llame a la línea gratis 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833).

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.