

## Atención de urgencia para pacientes con enfermedad de von Willebrand

Cuando su hijo tiene un trastorno de sangrado, es importante actuar con rapidez en caso de una lesión o sangrado visible.

### Cuando ocurre una lesión

Llame de inmediato a la Clínica de Trastornos de Sangrado (*Bleeding Disorders Clinic*, H Clinic) al 901-595-5041. Fuera del horario de atención y en días feriados, llame al número principal de St. Jude 901-595-3300 y pregunte por el hematólogo de guardia. Desde fuera de Memphis, utilice la línea gratuita, 1-866-2STJUDE (1-866-278-5833)

La enfermedad de von Willebrand (*Von Willebrand Disease*, vWD) se clasifica en tres tipos: 1, 2 y 3. Para el tipo 3 de vWD, no debe administrar una inyección intramuscular ya que podría causar sangrado en el músculo.

### Tipos de lesiones y qué debe hacer

**Sangrado de la membrana mucosa:** administre la cantidad recomendada de ácido aminocaproico (Amicar<sup>®</sup>) por boca según el plan de tratamiento de su hijo. Luego llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia.

**Sangrado ginecológico:** llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia para el plan de tratamiento de su hijo.

**Sangrado abdominal:** administre la dosis de factor según el plan de tratamiento de su hijo. Luego llame de inmediato a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia.

**Lesión en la cabeza:** primero administre el factor según el plan de tratamiento de su hijo; luego vaya a la sala de emergencias. En Memphis, su hijo debe ir al Departamento de Emergencias de Le Bonheur Children's Hospital.

**Traumatismo** (lesión o herida causada por un accidente): use una compresa de hielo para el sangrado en los tejidos blandos, músculos y articulaciones.

Siga el plan “RICE”

*R* = *Rest* (Descanso). No sostenga peso ni use la extremidad afectada.

*I* = *Ice the limb* (Coloque hielo en la extremidad). Use la compresa de hielo sobre un paño para proteger la piel..

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.

## Atención de urgencia para pacientes con enfermedad de von Willebrand

*C = Compress the limb* (Comprima la extremidad). Use una venda de compresión elástica (ACE) para proporcionar soporte.

*E = Elevate the limb* (Eleve la extremidad). Trate de mantener la extremidad a una altura más arriba del corazón.

Trate un sangrado con factor de coagulación tan pronto como pueda y continúe con el plan “RICE” durante al menos 24 horas. Si no mejora, llame a la Clínica de Trastornos de Sangrado o al hematólogo de guardia.

**Cortes y hematomas más leves:** Proporcione los primeros auxilios generales para hematomas y cortes pequeños. Use una gasa limpia y doblada de 2”x 2” para ejercer presión sobre los cortes y use una compresa de hielo para hematomas o hinchazón.

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico.